

**ແຜນພູມ 13. ປຸ້ນປົວຖອກທ້ອງ ແຜນ ຄ: ປຸ້ນປົວ ອາການຂາດນ້ຳຮ້າຍແຮງໂດຍໄວ**

→ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລູກສອນ. ຖ້າຄຳຕອບວ່າ ແມ່ນ ໃຫ້ໄປທາງຂວາງ. ຖ້າບໍ່ ໃຫ້ລົງລຸ່ມ.

**ເລີ່ມຈາກນີ້**  
ທ່ານສາມາດສິ່ງນ້ຳເຂົ້າເສັ້ນໄດ້ທັນທີບໍ່?

ໄດ້

> ເລີ່ມສິ່ງນ້ຳ RL ຫຼື normal saline 100ml/ກາ ເຂົ້າເສັ້ນທັນທີ ໂດຍແບງໃຫ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້. ຖ້າເດັກຕື່ມໄດ້ ໃຫ້ຕື່ມນ້ຳ ORS ໄປພ້ອມ

ອາຍຸ	ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ 30 ml/ກາ ໃນ:	ຕໍ່ໄປ ໃຫ້ 70 ml/ກາ ໃນ:
ເດັກອ່ອນ (ພູດ 12 ເດືອນ)	1 ຊົ່ວໂມງ <sup>a</sup>	5 ຊົ່ວໂມງ
ເດັກ (12 ເດືອນ ເຖິງ 5 ປີ)	30 ນາທີ <sup>a</sup>	2.5 ຊົ່ວໂມງ

<sup>a</sup> ໃຫ້ຕື່ມໄດ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຖ້າກຳມະຈອນຂໍ້ມືຍັງຄ່ອຍ ຫຼື ຄຳບໍ່ໄດ້.  
 ■ ປະເມີນເດັກຄືນ ທຸກ 15-30 ນາທີ. ຖ້າສະພາບມີນ້ຳ ຫາກຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ, ໃຫ້ປ່ອຍນ້ຳໄວຂຶ້ນ. ແຈ່ຕ້ອງຕິດຕາມອາການນ້ຳເກີນ.  
 > ໃຫ້ເດັກຕື່ມນ້ຳORS (ປະມານ 5ມລ/ກາ/ຊມ) ໄວທັນທີເມື່ອເດັກສາ ມາດຕື່ມໄດ້: ຕາມປົກກະຕິແມ່ນຫຼັງຈາກ 3-4 ຊມ (ເດັກອ່ອນ) ຫຼື 1-2 ຊມ (ເດັກໃຫຍ່).

ບໍ່

ມີບ່ອນທີ່ສາມາດສິ່ງນ້ຳເຂົ້າເສັ້ນຢູ່ໄກ້ໆ (ພາຍໃນ 30 ນາທີ ບໍ່)?

ມີ

■ ປະເມີນເດັກອ່ອນຫຼັງຈາກ 6ຊມ ແລະ ເດັກໃຫຍ່ ຫຼັງ 3 ຊົ່ວໂມງ. ຈັດປະເພດຂາດນ້ຳ ແລ້ວເລືອກແຜນປຸ້ນປົວທີ່ເໝາະສົມ (ກ, ຂ, ຫຼື ຄ) ເພື່ອສືບຕໍ່ການປຸ້ນປົວ.

> ສິ່ງໄປໂຮງໝໍ ດ່ວນ ເພື່ອສິ່ງນ້ຳເຂົ້າເສັ້ນ.  
 > ຖ້າເດັກສາມາດຕື່ມໄດ້, ສາທິດໃຫ້ແມ່ເບິ່ງວິທີເອົານ້ຳ ORS ໃຫ້ເດັກ ກິນເລື້ອຍໆເທື່ອລະນ້ອຍ.

ບໍ່

ທ່ານໄດ້ຮັບການອົບຮົມກ່ຽວກັບການໃຊ້ທໍ່ກະເພາະເພື່ອທົດແທນນ້ຳບໍ່?

ໄດ້

> ເລີ່ມທົດແທນນ້ຳORS ທາງທໍ່ (ຫຼື ກິນ): 20 ມລ/ກາ/ຊມ ໄລຍະ 6ຊມ (ລວມທັງໝົດ 120 ມລ/ກາ).

■ ປະເມີນອາການຂອງເດັກ ທຸກ 1-2 ຊົ່ວໂມງ:  
 — ຖ້າເດັກຍັງສືບຕໍ່ຮາກ ຫຼື ຫ້ອງເບິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃຫ້ນ້ຳຊ້າລົງ.  
 — ຖ້າສະພາບຂາດນ້ຳຫາກບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍຫຼັງ 3 ຊົ່ວໂມງ, ສິ່ງນ້ຳເຂົ້າເສັ້ນ.

ບໍ່

ເດັກຕື່ມໄດ້ບໍ່?

■ ຫຼັງ 6ຊມ, ໃຫ້ປະເມີນອາການເດັກຄືນໃໝ່ ແລະ ຈັດປະເພດຂາດນ້ຳ ແລ້ວເລືອກແຜນປຸ້ນປົວທີ່ເໝາະສົມ (ກ, ຂ, ຫຼື ຄ) ເພື່ອປຸ້ນປົວຕໍ່.

ບໍ່

ທ່ານໄດ້ຮັບການອົບຮົມກ່ຽວກັບການໃຊ້ທໍ່ກະເພາະເພື່ອທົດແທນນ້ຳບໍ່?

**ໝາຍເຫດ:** ໃຫ້ສັງເກດເດັກຢ່າງຕໍ່າ 6ຊມ ຫຼັງທົດແທນນ້ຳເພື່ອຄວາມພັ້ນໃຈວ່າແມ່ສາມາດຮັກສາເດັກບໍ່ໃຫ້ຂາດນ້ຳ ດ້ວຍການເອົານ້ຳ ORS ໃຫ້ ເດັກກິນທາງປາກ.

5. ຖອກທ້ອງ