

ຕາຕະລາງ 7. ການຈັດຂັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຂອງປອດອັກເສບ

| ອາການສາດ  | ຈັດປະເພດ                                     | ການປິ່ນປົວ  |
|---|--|---|
| <p>ໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈຍາກ ບວກກັບ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ຄຸ້ວມອີ່ມໂຕອີກຊີ &lt; 90% ຫຼື ກຳແພງສູນກາງ</li> <li>■ ຫາຍໃຈຊຸດໂຊມຮ້າຍແຮງ (ເຊັ່ນ ຄາງ, ຈອງດົງຜິງເອີກຮາຍແຮງຫຼາຍ)</li> <li>■ ອາການສູະແດງຂອງປອດອັກເສບພ້ອມອາການອັນຕະລາຍທົ່ວໄປ (ດື່ມ ຫຼື ດູດນິມບໍ່ໄດ້, ງ່ວງຂົມ ຫຼື ເສຍສະຕິ, ຊັກ)</li> </ul> | <p><b>ປອດອັກເສບຮ້າຍແຮງ</b></p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>— ສິ່ງເຂົ້າອນໂຮງໝໍ</li> <li>— ໃຫ້ອີກຊີຖ້າຄວາມອີ່ມໂຕອີກຊີ &lt; 90%.</li> <li>— ຄຸ້ມຄອງເສັ້ນທາງຫາຍໃຈຢ່າງເໝາະສົມ.</li> <li>— ໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຕາມການແນະນຳ.</li> <li>— ໃຫ້ປົວໄຂ້ສູງ ຖ້າມີ.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ຫາຍໃຈໄວ:             <ul style="list-style-type: none"> <li>— ≥ 50 ເທື່ອ/ນາທີ ໃນເດັກອາຍຸ 2-11 ເດືອນ</li> <li>— ≥ 40 ເທື່ອ/ນາທີ ໃນເດັກອາຍຸ 1-5 ປີ</li> </ul> </li> <li>■ ຈອງດົງຜິງເອີກ</li> </ul>   | <p><b>ປອດອັກເສບ</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>— ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ</li> <li>— ໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ເໝາະສົມ</li> <li>— ແນະນຳແມ່ເວລາໃດຄວນກັບມາກວດຄືນທັນທີຖ້າມີອາການປອດອັກເສບຮ້າຍແຮງ</li> <li>— ກັບມາຕິດຕາມເພື່ອກວດຄືນຫຼັງຈາກ 3 ມື້</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ບໍ່ມີອາການຂອງປອດອັກເສບ ຫຼື ປອດອັກເສບຮ້າຍແຮງ</li> </ul>   | <p><b>ບໍ່ແມ່ນ ປອດອັກເສບ: ໄອ ຫຼື ຫວັດ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ</li> <li>— ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ ແລະ ອາການໄອດ້ວຍຢາທີ່ປອດໄພ</li> <li>— ແນະນຳແມ່ເວລາໃດຄວນກັບມາກວດຄືນ</li> <li>— ກັບມາຕິດຕາມເພື່ອກວດຄືນຫຼັງຈາກ 5 ມື້ ຖ້າບໍ່ດີຂຶ້ນ</li> <li>— ຖ້າໄອເພີ່ມ 14 ມື້, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການແນະນຳໃນ ອາການໄອຊຳເຮື້ອ (ເບິ່ງໜ້າ 109)</li> </ul> |